


## 2. Schulaufgabe aus der Physik \* Klasse 8e \* 21.05.2015 \* Gruppe B \* Lösung

$$1. W_{\text{Spann}} = E_{\text{Spann}} = \frac{1}{2} \cdot D \cdot s^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,4 \frac{\text{N}}{\text{cm}} \cdot (7,0 \text{ cm})^2 = 34,3 \text{ Ncm} = 0,343 \text{ Nm} \approx 0,34 \text{ J}$$

2. Der Atomkern besteht aus 2 positiv geladenen Protonen und zwei neutralen Neutronen.  
Die Atomhülle besteht aus zwei negativ geladenen Elektronen.




$$3. 0 \text{ K} = -273 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \text{und} \quad 340 \text{ K} = (340 - 273) \text{ } ^\circ\text{C} = 67 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$4. 24,8 \text{ } ^\circ\text{C} = (24,8 + 273) \text{ K} = 297,8 \text{ K} \quad \text{und} \quad 65,0 \text{ } ^\circ\text{C} = (65 + 273) \text{ K} = 338 \text{ K}$$

$$\frac{p_2}{T_2} = \frac{p_1}{T_1} \Rightarrow p_2 = \frac{p_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{1009 \text{ hPa} \cdot 338 \text{ K}}{297,8 \text{ K}} = 1145,20 \dots \text{ hPa} \approx 1145 \text{ hPa}$$

5.



Beim Abkühlen von 4°C auf 0°C dehnt sich Wasser wieder aus.  
Man spricht von der **Anomalie** des Wassers.

$$6. P = \frac{W}{t} \quad \text{mit} \quad P = 1800 \text{ W} \quad \text{und}$$

$$W = \Delta E_i = c_w \cdot m \cdot \Delta \vartheta = 4,2 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 1100 \text{ g} \cdot (100 - 16) \text{ } ^\circ\text{C} = 388080 \text{ J} \approx 388 \text{ kJ}$$

$$t = \frac{W}{P} = \frac{388080 \text{ J}}{1800 \frac{\text{J}}{\text{s}}} = 215,6 \text{ s} = \frac{215,6}{60} \text{ min} \approx 3,6 \text{ min}$$

7. a) Die Größe  $4,2 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}}$  wird spezifische Wärmekapazität des Wassers genannt.

Diese Größe besagt, dass man die Energie 4,2 J benötigt, um 1 g Wasser um 1°C zu erwärmen.

b) Wenn 300 g Wasser von 16°C auf 0°C abgekühlt werden, dann liefert das die Energie

$$E = 4,2 \frac{\text{J}}{\text{g} \cdot ^\circ\text{C}} \cdot 300 \text{ g} \cdot 16 \text{ } ^\circ\text{C} = 20160 \text{ J} \approx 20 \text{ kJ}.$$

Da pro Gramm Eis die Energie 334 J zum Schmelzen benötigt werden, kann das warme

$$\text{Wasser also} \quad \frac{20160 \text{ J}}{334 \frac{\text{J}}{\text{g}}} = 60,35 \dots \text{ g} \approx 60 \text{ g} \text{ Eis zum Schmelzen bringen.}$$