









**Q12 \* Astrophysik \* 1. Extemporale im 2. Kurshalbjahr am 18.03.2011, Gruppe A**

1. a)  $r = \frac{1''}{p} \cdot \text{pc} = \frac{1''}{0,019''} \cdot \text{pc} = 53 \text{ pc} = 1,7 \cdot 10^2 \text{ Lj}$

$$m - M = 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} \Rightarrow M = m - 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} = 2,9 - 5 \cdot \lg \frac{53 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} = -0,72$$

b)  $M - M_{\odot} = -2,5 \cdot \lg \frac{L}{L_{\odot}} \Rightarrow \frac{M_{\odot} - M}{2,5} = \lg \frac{L}{L_{\odot}} \Rightarrow$


$$L^* = \frac{L}{L_{\odot}} = (10^{0,4})^{M_{\odot} - M} = 10^{0,4 \cdot (4,8 + 0,72)} = 1,6 \cdot 10^2$$

$$L \sim m^3 \Rightarrow L^* = (m^*)^3 \Rightarrow m^* = \sqrt[3]{L^*} = \sqrt[3]{160} = 5,4$$

2. a)  $m - M = 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} \Rightarrow M = m - 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} = 2,01 - 5 \cdot \lg \frac{20 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} = 0,50$

$$L^* = \frac{L}{L_{\odot}} = (10^{0,4})^{M_{\odot} - M} = 10^{0,4 \cdot (4,8 - 0,5)} = 52$$

b)



Bei Hamal handelt es sich um einen roten Riesen.

c)  $L = \sigma \cdot A \cdot T^4$  mit  $A = 4R^2\pi \Rightarrow \frac{L}{L_{\odot}} = \frac{R^2 \cdot T^4}{R_{\odot}^2 \cdot T_{\odot}^4} \Rightarrow \frac{R}{R_{\odot}} = \sqrt{L^*} \cdot \frac{T_{\odot}^2}{T^2} \Rightarrow$

$$R^* = \frac{R}{R_{\odot}} \approx \sqrt{52} \cdot \frac{5800^2}{4500^2} = 12$$

**Q12 \* Astrophysik \* 1. Extemporale im 2. Kurshalbjahr am 18.03.2011, Gruppe B**

1. a)  $r = \frac{l''}{p} \cdot \text{pc} = \frac{1''}{0,010''} \cdot \text{pc} = 10^2 \text{ pc} = 3,3 \cdot 10^2 \text{ Lj}$

$$m - M = 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} \Rightarrow M = m - 5 \cdot \lg \frac{100 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} = 3,1 - 5 \cdot \lg \frac{100 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} = -1,9$$

b)  $M - M_{\odot} = -2,5 \cdot \lg \frac{L}{L_{\odot}} \Rightarrow \frac{M_{\odot} - M}{2,5} = \lg \frac{L}{L_{\odot}} \Rightarrow$


$$L^* = \frac{L}{L_{\odot}} = (10^{0,4})^{M_{\odot} - M} = 10^{0,4 \cdot (4,8 + 1,9)} = 4,8 \cdot 10^2$$

$$L \sim m^3 \Rightarrow L^* = (m^*)^3 \Rightarrow m^* = \sqrt[3]{L^*} = \sqrt[3]{480} = 7,8$$

2. a)  $m - M = 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} \Rightarrow M = m - 5 \cdot \lg \frac{r}{10 \text{ pc}} = 2,24 - 5 \cdot \lg \frac{47 \text{ pc}}{10 \text{ pc}} = -1,1$

$$L^* = \frac{L}{L_{\odot}} = (10^{0,4})^{M_{\odot} - M} = 10^{0,4 \cdot (4,8 - 1,1)} = 2,3 \cdot 10^2$$

b)



Bei Etamin handelt es sich um einen roten Riesen.

c)  $L = \sigma \cdot A \cdot T^4$  mit  $A = 4R^2\pi \Rightarrow \frac{L}{L_{\odot}} = \frac{R^2 \cdot T^4}{R_{\odot}^2 \cdot T_{\odot}^4} \Rightarrow \frac{R}{R_{\odot}} = \sqrt{L^*} \cdot \frac{T_{\odot}^2}{T^2} \Rightarrow$

$$R^* = \frac{R}{R_{\odot}} \approx \sqrt{230} \cdot \frac{5800^2}{4200^2} = 29$$